

# *Gyromitra infula* (Schaeffer ex Fries) Quélet


## Gyromitre en turban

[LC]



### Classification

Règne :	Champignons
Phylum :	Ascomycota
Classe :	Pézizomycètes
Ordre :	Pézizales
Famille :	Discinaceae
Genre :	<i>Gyromitra</i>
Sous-genre :	<i>Gyromitra</i>



> *Gyromitra infula*  
© G. Corriol

### Écologie

Pérennité : AF    Hôtes : Conifères


Hôte(s) occ. : Feuillus

Situation : Débris ligneux

Décomposeur : 2

Pourriture : à rechercher

Type trophique : Sl



(données juillet 2016) © A. Hamdi/CBNPMP

## Caractères clés

- Chapeau à 2 ou 3 lobes évoquant une selle à cheval ou un turban, à marge soudée au pied, parfois faiblement cérébriforme, 3 à 10 cm, brun rougeâtre ;
- Pied > 2 cm, subcylindrique, non lacuneux\*, velouté\* de blanchâtre sur fond vineux ;
- À l'automne (août à octobre), sur tronc mort au sol et moussu de Sapin préférentiellement.



> Gyromitra infula. © C. Hannoire/CBNPMP (à gauche et à droite) | R. Cazenave/AMB (au centre)

## Confusions possibles

### Gyromitra ambigua

- Sosie à habitat et phénologie similaires ;
- Répartition nordique, non recensée en France.



> Gyromitra esculenta.

© G. Corriol

### Gyromitres ressemblants

(*esculenta*, *gigas*, *ticiniana* - R, *fastigiata* - RR)

- Espèces printanières (mars à juin) ;
- Pied blanchâtre sans teinte purpurine ;
- Chapeau nettement cérébriforme à l'exception de *G. fastigiata*, à chapeau bilobé ;
- Chapeau jusqu'à 12cm pour *G. gigas* et *fastigiata* ;
- Sous feuillus pour *G. ticiniana* et *gigas*.



> Helvella sulcata.

© C. Hannoire/CBNPMP

### Pseudorhizina sphaerospora RR

- Espèce estivale ;
- Feuillus ou conifères ;
- Marge non attenante au pied ;
- Pied lacuneux\*.

### Helvelles

Certaines pourraient évoquer un gyromitre bien qu'elles ne présentent jamais la combinaison de caractères de *G. infula* (habitat lignicole, chapeau brun rougeâtre en turban, et pied subcylindrique\*).



> Helvella atra.

© G. Corriol