

Polyporus squamosus (Huds. : Fr.) Fr.


Polypore écailleux

[LC]



Classification

Règne : Champignons
Phylum : Basidiomycota
Classe : Agaricomycètes
Ordre : Polyporales
Famille : Polyporaceae



› *Polyporus squamosus*.
© G. Corriol

Écologie

Pérennité : AC Hôtes : Feuillus


Hôte(s) occ. : Mélèze

Situation : Un peu au dessus du sol, parfois en hauteur, sur souche et tronc mort en place, rarement tombé

Décomposeur : ①

Pourriture : Bl

Type trophique : Sl



(données juillet 2016) © A. Hamdi/CBNPMP

Caractères clés

- Presque exclusivement sur gros bois mort de feuillus, un peu au-dessus du sol, sur souche et tronc mort en place, rarement tombé.
- Pied latéral***, trapu, à **cortex noirâtre** à la base ;
- Chapeau beige à larges **écailles brunes**, généralement > 15 cm de diamètre et **jusqu'à 30 cm** ;
- Pores* **amples**, 1-2 par mm ;
- Chair de consistance **tendre** ;
- Odeur et saveur prononcées de **concombre**.

Confusions possibles

N.B. : considérant ici qu'il n'y a pas de risque de confusion particulier avec les *Polyporus* lisses à chinés, ceux à pores très fins, ou les espèces méditerranéennes (*P. corylinus* et *P. meridionalis*).

Polyporus tuberaster

- Sur feuillus divers, **petits** troncs ou branches, branchettes tombées ;
- Pied central** le plus souvent, **sans cortex noirâtre**, tout au plus un peu feutré de brun-rougeâtre à la base ;
- Chapeau **jusqu'à 25 cm de diamètre** ;
- Odeur et saveur **fongiques** faibles.

Polyporus arcularius et *P. brumalis*

- Sur bois mort en général de **petit** diamètre, surtout de feuillus ;
- Pied **central**, rarement un peu excentrique, à base brun noirâtre sur certains exemplaires âgés mais **sans véritable cortex** ;
- Chapeau **jusqu'à 8 cm de diamètre** ;
- Odeur et saveur **faibles**.

Polyporus alveolaris

- Sur feuillus divers, **petits** troncs, branches, ou branchettes, tombées hors sol, parfois à plusieurs mètres ;
- Pied latéral ou excentrique, à base noirâtre sur certains exemplaires mais **sans véritable cortex** ;
- Chapeau **atteignant 11 cm de diamètre** ;
- Odeur et saveur **fongiques**.



› *Polyporus squamosus*.

© G. Corriol



› *Polyporus squamosus*.

© R. Cazenave



› *Polyporus tuberaster* [LC].

© G. Corriol



› *Polyporus alveolaris* [LC].

© G. Corriol