

# *Podofomes trogii* (Fr.) Pouzar

Fomès à pied

[EN]



## Classification

Règne : Champignons  
 Phylum : *Basidiomycota*  
 Classe : Agaricomycètes  
 Ordre : Polyporales  
 Famille : *Polyporaceae*



> *Podofomes trogii*.  
 © G. Corriol/CBNPMP

## Écologie

Pérennité : AC Hôtes : Sapin

Hôte(s) occ. : Hêtre

Situation : Base de souche ou tronc,  
bois mort enterré

Décomposeur : ?

Pourriture : Bl

Type trophique : Sl

Répartition : dans le Sud-ouest : pyrénéenne, R (départements 09, 11, 64, 65)

## Caractères clés

- Sur Sapin ou Épicéa, (rarement sur Hêtre in. litt.), sur troncs et souches morts en place, ou bois enterré ;
- Présence d'un **pied distinct**, central ou latéral\*, **brun chocolat à noirâtre** ;
- Chapeau **orbiculaire\*** brun chocolat à noirâtre, à **cernes** discolores, **mat et feutré\*** ;
- Pores\* **beiges** à brun gris, **2 à 4 / mm**, se tachant au toucher.

## Confusions possibles

*Ischnoderma* ☆ à ☆☆☆  
(cf. fiche n° 3)

- Sur feuillus ou conifères ;
- **Pied toujours absent.**

*Ganoderma carnosum* ☆☆  
(cf. fiche n° 9)

- Sur conifères ;
- Revêtements du pied et du chapeau remarquablement **vernissés** ;
- **Jamais de reflets bleutés.**



> *Podofomes trogii*.

© R. Cazenave/AMB



> *Ischnoderma benzoinum*.

© G. Corriol



> *Podofomes trogii* (à gauche) ; *Ganoderma carnosum* (à droite).



© R. Cazenave/AMB