

Pseudoplectania melaena (Fries) Saccardo
= *Pseudoplectania vogesiaca* (Persoon) Seaver.

[NT]



Classification

Règne : Champignons
Phylum : Ascomycota
Classe : Pézizomycètes
Ordre : Pézizales
Famille : Sarcosomataceae



› *P. melaena* sur tronc de Sapin au sol, dans une vieille sapinière des Pyrénées centrales. © C. Hannoire/CBNPMP

Écologie

Pérennité : AF Hôtes : Sapin

Situation : Tronc moussu au sol

Décomposeur : 2

Pourriture : à rechercher

Type trophique : Sl



(données juillet 2016) © A. Hamdi/CBNPMP

Caractères clés

- Printanier sur **Sapin** ;
- En **coupe** puis en **disque** jusqu'à 6 cm de diamètre ;
- Hyménium **noir sans aucun reflet bleu ou violacé**, ridé sur le tard ;
- Face ext. feutrée **concolore** ;
- Pied court ou nul ;
- Marge **crénelée** parfois fendue.



Confusions possibles

Pseudoplectania nigrella

- Plus petite ;
- Pied plus long ;
- Exclusivement sur **Epicéa**, plutôt dans la litière.

Bulgaria inquinans

- Chair **gélifiée** et **salissante** (marque les doigts) ;
- Face extérieure **brune** chez les jeunes ;
- Sur feuillus, surtout **Chêne**.



Plectania melastoma

- Face extérieure et marge ornées de **granulations oranges**.

Sarcosoma globosum

- Face extérieure brune **profondément plissée** ;
- Chair gélifiée ;
- Litière des forêts anciennes d'**épicéas**.



Urnula craterium

- En coupe **profonde** ;
- Face ext. pustuleuse.

