


Classification

Règne : Champignons
 Phylum : Basidiomycota
 Classe : Agaricomycètes
 Ordre : Russulales
 Famille : Hericiaceae



› *Hericium clathroides* sur Hêtre dans une RBI de Fontainebleau (77).
 © C. Hannoire

Écologie

Pérennité : AC Hôtes : cf. Caractères clés page suivante

Hôte(s) occ. : cf. page suivante


Situation : cf. page suivante

Décomposeur : 2

Pourriture : Bl

Type trophique : Sl

Clé de détermination des champignons lignicoles blancs à aiguillons



Confusions possibles



Caractères clés

- Hericium clathroides** [EN] ★★★
- Hydne corail des feuillus** ★★★
- Sur **feuillus**, surtout Hêtre ;
 - Structure **ramifiée**, buissonnante jusqu'à 40 cm ;
 - Aiguillons **jusqu'à 2 cm** maximum.
- Hericium flagellum** [EN] ★★★
- Hydne corail des résineux** ★★★
- Sur **Sapin**, plus rarement Épicéa ;
 - Structure **ramifiée**, buissonnante jusqu'à 40 cm ;
 - Aiguillons **jusqu'à 2 cm** maximum.
- Hericium erinaceum** [VU] ★★
- Hydne hérisson** ★★
- Sur **feuillus**, souvent Hêtre ou Chêne ;
 - Champignon **d'un bloc**, portant de longs **aiguillons jusqu'à 4 cm**.
- Hericium cirrhatum** [NT] ★★
- Créolophe ondulé** ★★
- Sur **feuillus** ;
 - Champignon constitué de **chapeaux imbriqués**, plats, étagés, portant des **aiguillons jusqu'à 1,5 cm**.

