

Classification

Règne : Champignons
 Phylum : Basidiomycota
 Classe : Agaricomycètes
 Ordre : Russulales
 Famille : Auriscalpiaceae



› *Lentinellus castoreus* en hêtre submature des coteaux de Gascogne
 © C. Hannoire/CBNPMP

Écologie

Pérennité : AC Hôtes : cf. p. 55

Hôte(s) occ. : cf. p. 55

Situation : Bois mort au sol


Décomposeur : à rechercher

Pourriture : à rechercher

Type trophique : Sl



Clé de détermination macro. des lentins charnus (>=5cm) à stipe latéral, et ressemblants (clé inspirée de Moreau et al. 2001)



GLOSSAIRE

*Âcre : piquante.

*Charnus : >= 5 cm, ne considérant ici que des champignons pleurotoïdes.

*Hypoderme : couche du revêtement du chapeau située sous l'épicutis (couche la plus externe) au-dessus de la chair.

*Latéral : implanté sur le côté du chapeau, et dont la marge ne fait pas le tour du pied.

*Tomentum : couche la plus externe du revêtement du chapeau, lorsqu'il est poilu.

Moreau P.-A., Roux P. 2001. Les « Lentins » (genres *Lentinellus* et *Lentinus* ss. lato) approche macroscopique et compléments. Bull. Fed. Myco. Bot. Dauphiné-Savoie 162 : 5-13.

